

# Etude CADEPO

Enquête sur l'appréciation clinique du **statut psychologique** des **patients de 75 ans et plus en oncologie** lors de la réalisation du **score G8**

A.RAYMOND, E.ORILLARD, A.ALTMEYER, D.KORNER

## CONTEXTE

Augmentation du nombre de personnes âgées suivies en oncologie

Augmentation du nombre de situations complexes

Création d'une EGA\* après la réalisation du G8

Un des items du G8 évalue la présence d'un syndrome dépressif

**Syndrôme dépressif =**  
Altération de la qualité de vie du patient, de ses proches et de l'efficacité des traitements

## OBJECTIF PRINCIPAL

Comparer l'hétéro-évaluation médicale des symptômes dépressifs, via le score de l'item « troubles neuropsychiatriques » du G8, avec une auto-évaluation, via le score GDS15, chez les patients de 75 ans et plus atteints d'un cancer et en cours de traitement dans le service d'oncologie de l'HNFC



## METHODE

Monocentrique

Descriptive de nature quantitative

Méthode d'enquête par questionnaires de pratiques courantes issus de recommandations en oncogériatrie

## RESULTATS



**Différence significative (p=0.025) entre les réponses des patients au GDS15 et les réponses des oncologues à la question sur les troubles neuropsychiatriques du G8**

## PERSPECTIVES

Temps théorique de remplissage du G8 de 4,4 min = Insuffisant

Situations complexes  
Compétences

Leadership

Parcours de soins

### Oncologie HNFC:

- Dépression sous-estimée
- Nombre de patients dépressifs plus élevé que les chiffres de la littérature

Diminution de la démographie médicale

Augmentation du nombre de patients en oncologie

Consultation consacrée au remplissage du G8 (symptômes dépressifs)

Infirmière en Pratique Avancée